

**ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS PADA NY. H P5A0 DENGAN
KETIDAKEFEKTIFAN PEMBERIAN ASI DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS CABANGBUNGIN TAHUN 2019
(Ida Royani, 2019, 52 halaman)**

ABSTRAK

Latar belakang : Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama penyebab kematian ibu melahirkan pada tahun 2010, yaitu Pendarahan (28%), Eklampsia (24%), dan Infeksi (11%). Sekitar 50% dari kematian pada masa nifas terjadi pada 24 jam pertama setelah melahirkan, diantaranya disebabkan oleh adanya komplikasi masa nifas.

Tujuan umum : Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada Ny. H P5A0 dengan ketidakefektifan pemberian ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Cabangbungin.

Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yang berbentuk Studi Kasus, adapun sampelnya adalah klien H, dan teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan pengamatan, wawancara, pemeriksaan fisik, dokumentasi/catatan perawatan, partisipasi aktif.

Hasil : setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 hari diagnosa keperawatan yang didapatkan 1, yaitu : Ketidakefektifan Pemberian ASI. Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana tindakan yang telah diterapkan.

Kesimpulan : kerjasama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga sngat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien sehingga masalah keperawatan pasien mengenai ketidakefektifan pemberian ASI dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagian masalah dapat teratasi sebagian.

Kata kunci : postpartum, ketidakefektifan pemberian ASI