

ABSTRAK

Latar Belakang : VAP dapat memperpanjang durasi ventilator dan memperpanjang masa rawat inap hingga 7-9 hari dengan angka kematian diatas 50%. Dari 2006 hingga 2014, jumlah pasien VAP di 20 provinsi di seluruh China daratan yaitu 23,8% yang masih lebih tinggi dari ambang batas Central of Disease Control (CDC) 5,8%. *Institute for Healthcare Improvement (IHI)* merekomendasikan untuk membuat Bundle sebagai strategi pencegahan. **Tujuan :** Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia (VAP)* di ruang ICU. **Metode :** Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan pendekatan *Cross Sectional Study*. Sample yang digunakan adalah 40 responden. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam pelaksanaan bundle VAP adalah motivasi p -value ($<0,05$). Adapun faktor-faktor yang tidak berhubungan ialah usia $0,082$ p -value ($>0,05$), jenis kelamin $-0,064$ p -value ($>0,05$), pendidikan $-0,142$ p -value ($<0,05$), lama kerja $-0,92$ p -value ($<0,05$), pengetahuan $0,288$ p -value ($<0,05$). **Kesimpulan :** Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia (VAP)* adalah motivasi dengan p -value $0,049$ ($<0,05$). **Saran :** Untuk penelitian selanjutnya bisa dijadikan sebagai referensi untuk dilakukan penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perawat dalam pelaksanaan *Bundle Ventilator Associated Pneumonia (VAP)*.

Kata Kunci : *Bundle Ventilator Associated Pneumonia (VAP)*, ICU, Kepatuhan perawat, Motivasi